

Bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa)

Botrytis-soorten zijn belangrijke ziekteverwekkers in uien. Overal waar uien geteeld worden komt deze schimmel voor.

Symptomen

Bladvlekkenziekte is herkenbaar aan kleine, witte vlekjes met een lichtgroene halo. In het begin zijn de vlekjes niet te onderscheiden van vlekjes veroorzaakt door insecten, hagel of mechanische schade. Bij een aantasting met bladvlekken scheurt het blad na samendrukken dwars door de lesie. Na verloop van tijd worden de lesies groter, smelten ze samen en kunnen ze bladafsterving veroorzaken.

Ontwikkeling en infectie

De ziekte slaat meestal toe aan het einde van het groeiseizoen en vooral op oud blad. Koele, vochtige omstandigheden zijn gunstig voor de ziekte. Een loofrijk gewas is extra gevoelig, omdat dat langer vochtig blijft. De schimmel kan in de grond overwinteren op plantresten en in de vorm van sclerotia. Ook afvalhopen zijn een bron van infectie.

Voorkomen en bestrijden

Een accuraat en preventief spuitschema gebaseerd op de weersvoorspellingen is noodzakelijk. Verwijderen of afdekken van afvalhopen verkleint de kans op verspreiding van sporen. Vruchtwisseling toepassen.

(Bron: De Groot en Slot B.V. – Belangrijke plagen en ziekten in uien)