

## Symptomen

Hagelschade is alleen waarneembaar op aan hagel blootgestelde bladeren en bollen. Hagelstenen of de druppels van een slagregen vormen ronde of onregelmatige plekjes met een wit tot gele kleur. De gevolgen van hagelschade zijn groter in een volgroeid gewas. Ernstige schade aan het loof kan leiden tot uitstel van bolvorming. De veroorzaakte wondjes op het blad zijn een ingang voor secundaire pathogenen.

## Voorkomen en bestrijden

Na schade is het raadzaam om te spuiten met een schimmelbestrijdingsmiddel. Eventueel in combinatie met sporenelementen, om wondheling zo snel mogelijk te laten plaats vinden en verdere verzwakking van de plant te voorkomen. Wanneer hagelschade vlak voor de oogst of voor het strijken heeft plaats gevonden, kan het raadzaam zijn deze uien mechanisch te strijken om vollopen van de pijpen met water te voorkomen. Het platstrijken bij voorkeur uitvoeren met een rollende plastic pijp om beschadiging aan het blad en inloop van bacterieziekte zo veel mogelijk te beperken. Veelal zijn uienbollen die beschadigd zijn door hagel slecht of beperkt houdbaar.

*(Bron: De Groot en Slot B.V. "Belangrijke plagen en ziekten in uien")*