

Preimot (*Acrolepiopsis assectella*)

Symptomen

De larven van de preimot vreten gangen in het blad, waardoor enigszins doorzichtige plekjes (vensters) ontstaan. Door natuurlijke achteruitgang van het vliesje ontstaan er vervolgens gaten in het blad. Een tweede generatie rupsen kan ook de bollen aanvreten, wat koprot tot gevolg kan hebben. De eerste aantasting wordt meestal in de randrijen gevonden.

Ontwikkeling en infectie

De preimot is een onopvallende nachtvlinder. Doorgaans zijn er drie vluchten per jaar, soms zelfs vier. Het is hoofdzakelijk de tweede generatie die de schade veroorzaakt. De eitjes van de mot zijn vuilwit van kleur en worden verspreid over het blad afgezet. Na gemiddeld acht dagen komen de eieren uit en gaan de grijswitte tot groene larven het blad mineren. De rupsen zijn vanaf half mei tot half september, met een korte onderbreking in juni aanwezig. De preimot houdt van warme, droge zomers. Naast ui zijn ook andere gewassen uit de Allium familie waardplant voor dit insect.

Voorkomen en bestrijden

Er zijn geen maatregelen bekend die preventief werken. Zodra er vreterij wordt waargenomen een gewasbehandeling uitvoeren.

(Bron: De Groot en Slot B.V. "Belangrijke plagen en ziekten in uien")